



EFICACIA DE LA FIBROBRONCOSCOPIA MÁS LAVADO BRONCO-ALVEOLAR PARA EL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014

Quintero J L, Ojeda A Y, Mendoza C A

RESUMEN

Objetivo: Determinar la eficacia del uso de la fibrobroncoscopia más lavado broncoalveolar para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar en pacientes con baciloscopia de esputo seriada negativa.

Metodología: Es un estudio de corte, prospectivo, unicéntrico. Donde se utilizó una metodología de tipo mixto por la integración de elementos cualitativo y cuantitativo.

Resultados: 116 pacientes sintomáticos respiratorios, 32 pacientes fueron sometidos a FBC-LBA, de estos fueron seleccionados 19 para participar en la investigación. La eficacia de FBC-LBA fue de 21.05% para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, la frecuencia de técnicas de intervencionismo fue de 27.58%. Los síntomas hallados con mayor frecuencia fueron, tos, disnea, astenia y expectoración.

PALABRAS CLAVES: Tuberculosis pulmonar, Fibrobroncospia

