



TRATAMIENTOS PARA PSORIASIS EN MUJERES DE 25 A 55 AÑOS DIAGNOSTICADAS EN CONSULTA DERMATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEZ EN LA CIUDAD DE CÚCUTA NORTE DE SANTANDER COLOMBIA EN LOS AÑOS 2014 AL 2016

Fuquen Katherine¹, Rivera Xiomara¹, Rolon Paola¹, Moreno Figueredo Alexander², Rubiano José³

¹Estudiantes de medicina, Semillero de investigación HYGEA, Universidad de Pamplona.

²MD Dermatólogo, Docente Departamento de Medicina, Universidad de Pamplona

³MSc. Docente Departamento de Medicina, Universidad de Pamplona.

Objetivo. Identificar el tratamiento con mayor eficiencia para Psoriasis, en mujeres de 25 a 55 años de edad, diagnosticadas en consulta dermatológica del Hospital Universitario Erasmo Meoz de la Ciudad de Cúcuta Norte de Santander, Colombia en los años 2014 al 2016. **Metodología.** Se realizó un estudio de tipo descriptivo observacional, de pacientes mujeres de 25-55 años con psoriasis diagnosticadas en el servicio de Dermatología del Hospital Erasmo Meoz (HUEM), Cúcuta Norte de Santander, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016. Los datos de caracterización de la población, factores de riesgo, tiempo de resolución de las lesiones post tratamiento, tratamientos recibidos, tiempos de instauración, controles y efectos adversos de estos, la valoración de las características y nivel de compromiso de las lesiones pre y post tratamiento fueron consultados en las historias clínicas. La evaluación de las características de las lesiones para hacer una estimación global del compromiso de la psoriasis se usó la escala Physician Global Assessment, (PGA). El número de pacientes y selección de estos en cuanto a género y edad fueron suministrados por el área de archivo clínico del hospital, información que fue tabulada e ingresada a una base de datos de Microsoft Excel creada para dicho fin. **Resultados.** La población total fue de 60 pacientes, de las cuales se incluyeron 34, el rango de edad estuvo entre los 25 y 55 años, 21 de ellas entre los 45 y 55 años, 13 presentan un índice de masa corporal en sobrepeso, hay una marcada incidencia de la menopausia como factor de riesgo con 13 pacientes. En cuanto a los





DEPARTAMENTO DE MEDICINA

tratamientos 26 terminaron con agentes biológicos, 6 quedaron con tratamiento combinado y 2 con tratamiento tópico. Según el análisis de cada tratamiento, adalimumab siempre muestra mejoría de las lesiones. Entre los efectos adversos solo se encontró un caso con hipersensibilidad retardada en una paciente que recibió adalimumab.

Palabras claves: terapéutica (D013812), resultados de tratamiento (D016896), psoriasis (D011565)

